



ATLANTIS PLUS

Atlantis Plus, bitkisel menşeli organik bileşenlerden oluşan, yeni nesil bir gübredir. İçerisinde bulunan yüksek alginik asit, giberallik asit barındıran zengin içeriğe sahip, spesifik bir üründür. Gelişim döneminde kullanıldığında kök gelişimini hızlandırarak bitkiye direnç verir. Homojen çiçek ve meyve oluşumuna, verime destek verir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Organik Madde	5
Alginik Asit	1
Giberallik Asit	1 ppm
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	2
Maksimum EC	4.9 dS/m
pH Aralığı	9.4-11.4

KULLANIM ALANI,ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek vs.)	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar bir hafta ara ile uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	100-1500 cc/da
Tüm Açık Alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek vs.)	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrerrde uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	100-1500 cc/da
Tüm Yapraklı Yenilen Kışlık Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kivircık, Aysberg vs.)	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerrde uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	100-1500 cc/da
Kavun, Karpuz, Kabak vs.	Ekim dikimden itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	100-1500 cc/da
Tüm Yumru Bitkilerde (Soğan, Sarımsak, Patates, Havuç, Turp, Şeker Pancarı)	Çiçeklenme başlangıcında ve yumru bağlama ve yumru büyütme döneminde uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	100-1500 cc/da
Kesme Çiçekçilikte	Ekim dikimden itibaren sezon boyunca haftalık uygulama yapılır. Üç uygulama tavsiye edilmektedir.	100 litre suya 150-200 cc	100-1500 cc/da
Tüm Meyve Ağaçlarında (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem, Bağ vs.)	1. Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde 2. Meyve oluşumunda 3. Hasat sonuna kadar uygulanır.	100 litre suya 200-250 cc	100-1500 cc/da veya 80-100 cc/ağaç 30 cc/omca
Muz ve Narenciye, İncir, Zeytin, Ceviz, Badem ve Kivi	Çiçeklenme başlangıcı, meyve dökümünde, meyve büyütme ve hasat öncesi	100 litre suya 200-250 cc	100-1500 cc/da veya 80-100 cc/ağaç
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Nohut, Fasulye, Mercimek, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Çay)	5-6 yapraklı dönemden hasat öncesine kadar 20-30 gün aralıklar ile 2-3 tekrerrde uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	100-1500 cc/da
Tüm Tarla Bitkilerinde (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf)	İlkbahardan yabancı ot ilacı ile birlikte ve kardeşlenme döneminde uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	-----
Tüm Yem Bitkilerinde (Yonca, Korunga Fiğ)	Her biçimden 10 gün sonra yaprakdan uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	-----